

Таблица 1. Результаты исследования параметров приверженности лечению в группе и подгруппах в зависимости от выраженности восприятия угрозы (в баллах)

Параметры приверженности лечению	Значение по всей выборке	Восприятие болезни как умеренной угрозы	Восприятие болезни как выраженной угрозы	Значимость различий
	Me ± SD, баллы			
Дыхательная гимнастика (кинезиотерапия)	3,30 ± 0,98	3,60 ± 1,08	2,79 ± 0,70	p < 0,049
Ингаляции при помощи небулайзера	3,90 ± 1,21	4,20 ± 1,13	3,69 ± 1,07	p < 0,045
Дозированные ингаляторы	3,25 ± 1,33	3,30 ± 1,49	3,22 ± 1,30	p < 0,906
Прием антибиотиков (перорально)	3,90 ± 1,02	3,60 ± 1,05	4,43 ± 0,77	p < 0,030
Внутривенное введение антибиотиков	3,05 ± 1,68	3,22 ± 1,71	3,11 ± 1,69	p < 0,892
Прием антибиотиков в виде аэрозоля	2,67 ± 1,64	3,00 ± 1,94	2,13 ± 1,25	p < 0,293
Ферменты поджелудочной железы	3,45 ± 1,70	3,80 ± 1,48	3,33 ± 1,87	p < 0,552
Пищевые добавки	2,50 ± 1,10	3,00 ± 1,15	2,00 ± 0,93	p < 0,045
Витамины	3,68 ± 1,06	3,89 ± 0,78	3,33 ± 1,22	p < 0,268
Занятия спортом (общие физические упражнения)	2,90 ± 0,85	3,10 ± 0,74	2,56 ± 0,88	p < 0,161