

Листовка вашему покупателю

Алкоголь несовместим ни с одним лекарством


Самые опасные для жизни эффекты могут наступить при употреблении алкогольных напитков вместе с...



- кофеином, эфедрин, теофедрин (гипертонический криз)
- сахароснижающими препаратами и инсулином (гипогликемическая кома)
- нитроглицерином (усиление боли в сердце)

Минеральная вода не сочетается с большинством препаратов

Запивать минералкой можно эритромицин и препараты йода.



Грейпфрутовым соком нельзя запивать*:

- **Анксиолитики:** алпразолам, буспирон, мидазолам, триазолам
- **Антиаритмические:** амиодарон, квинидин
- **Антибиотики:** кларитромицин, эритромицин
- **Антигистаминные:** фексофенадин
- **Антикоагулянты:** варфарин
- **Антиэпилептические:** карбамазепин
- **Бета-блокаторы:** карведилол
- **Блокаторы кальциевых каналов:** дилтиазем, фелодипин, нифедипин, нимодипин, верапамил
- **Гормональные средства, содержащие:** кортизол, эстрадиол, метилпреднизолон, прогестерон, тестостерон
- **Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы (гиполипидемические):** аторвастатин, флувастатин, ловастатин, симвастатин
- **Ингибиторы обратного захвата серотонина (антидепрессанты):** сертралин, флувоксамин
- **Ксантины:** теофиллин
- **Противогрибковые:** итраконазол
- **Репотентеры:** силденафил, тадалафил
- **Средство для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы:** финастерид

* Указаны названия действующих веществ, торговые наименования уточняйте в аптеке.

Единственное универсальное средство для запивания таблеток — вода. Но не со льдом, а комнатной температуры в количестве до 1 стакана.

Все случаи, когда лекарство нужно запивать чем-то, кроме воды, указаны в инструкции.



Закажите бесплатно любое количество экземпляров листовки и вручайте вместе с покупкой лекарственных средств. Листовки — прекрасный способ повысить не только информированность потребителей, но и лояльность к аптеке. Редакция принимает заказы по почте, факсу, e-mail.